

Título Validation of a Spanish Version of the Remoralization Scale

Tipo de Producto Publicación Científica

Autores Musso, M.; Scherb, E., Wyss, G., Cascallar, E. y Vissers, W.

Código del Proyecto y Título del Proyecto

C17S07 - Desmoralización, impulsividad y consumo de sustancias: un estudio en adultos jóvenes argentinos

Responsable del Proyecto

Wyss, Gertrudis

Línea

Psicología Clínica

Área Temática

Psicología

Fecha

Julio 2017

INSOD

Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas
Proyectuales

UADE 

Validación de la versión en español de la Escala de remoralización☆

Author links open overlay panel [Mariel F. Musso^a](#) [Elena D. Scherb^b](#) [Gertrudis Wyss^c](#) [Eduardo C. Cascallar^d](#) [Wiede Vissers^e](#)

Anuario de Psicología. (47) 1-8.

Publicación en: <https://www.researchgate.net/publication/317507664>

Abstract

The Remoralization Scale (RS) was developed in order to measure an individual's state in terms of how the person perceives him or herself in relation to his/her self-concept, self-value, hope, empowerment and positive anticipation. However, there is no data on the psychometric properties of the instrument in a non-clinical population. The aim of this study was to validate a Spanish version of the Remoralization Scale (RS) in a non-clinical sample with a prevention objective and/or the promotion of mental health. The original version of the RS was translated into Spanish and it was applied to a non-clinical sample of 1443 university students in Argentina (18–25 years old). Exploratory and confirmatory factor analyses were performed to study the factorial structure and the validity of the construct. Results suggest that a two factor-model (self-satisfaction and self-concept) results in the best fit for this non-clinical population. The reliability of the total scale and for both sub-scales was moderate to high. Discriminant analysis and contrasting groups analysis showed significant results: the clinical sample and the depression-symptoms sample showed less “remoralization” than the non-clinical sample and a group without depression symptoms, respectively. Results are discussed taking into account previous conceptualizations and studies. In conclusion, the RS was validated for its use in a non-clinical Argentinean population. Regarding its construct validity, a two-factor model with high reliability was obtained.

Resumen

La Escala de Remoralización (RS) fue desarrollada para medir el estado de un individuo en términos de cómo se percibe a sí mismo con relación a su autoconcepto, autovaloración, esperanza, empoderamiento y anticipación positiva.

Sin embargo, no hay datos de propiedades psicométricas en la población no clínica. El objetivo de este estudio fue validar una versión española de la RS en una muestra no clínica con un objetivo de prevención y/o promoción de la salud mental. La versión original de la RS fue traducida al español y se aplicó a una muestra no clínica de 1.443 estudiantes universitarios en Argentina (de 18 a 25 años). Se realizaron estudios de análisis factorial exploratorio y confirmatorio para estudiar la estructura factorial y la validez del constructo. Los resultados indican que un modelo de 2 factores (autosatisfacción y autoconcepto) presenta un mejor ajuste para esta población no clínica. La consistencia interna de la escala total y de ambas subescalas fue de moderada a alta. Los análisis discriminantes y análisis de grupos contrastados fueron significativos: la muestra clínica y sujetos con síntomas de depresión mostraron menos «remoralización» que la muestra no clínica y sujetos sin síntomas depresivos. Los resultados se discutieron teniendo en cuenta conceptualizaciones y estudios previos. En conclusión, la RS fue validada para su uso en una población no clínica de Argentina. Respecto a su validez de constructo, se obtuvo un modelo de 2 factores con una alta confiabilidad.